

Brentuximab Vedotin / Etoposide / Cyclophosphamide / Doxorubicine / Dacarbazine / Déxaméthasone PROTOCOLE BRECADD

Présentation du traitement

Le **brentuximab vedotin** est un médicament de thérapie ciblée administré par perfusion à l'hôpital. Il sera associé dans ce protocole à d'autres molécules de chimiothérapies, l'**étoposide**, le **cyclophosphamide**, la **doxorubicine** et la **dacarbazine**. La **déxaméthasone** est un médicament corticoïde utilisé également dans le protocole et pris par voie orale une fois par jour du 1^{er} jour au 4^{ème} jour de chaque cycle. Ce protocole est prescrit par votre médecin hématologue.



Modalités d'administration

Avant de débuter le traitement, un boîtier situé sous la clavicule pourra vous être posé par un chirurgien pour l'administration des produits. Ce dispositif communément appelé chambre implantable ou PAC, permettra d'éviter de vous piquer dans les veines du bras. Il restera en place pendant toute la durée du traitement et permettra de conserver une activité normale (voyage, baignade...).



Un patch anesthésiant pourra être posé 30 à 60 minutes avant de connecter les produits de chimiothérapie sur votre chambre implantable pour l'administration.

Le traitement peut interagir avec vos autres médicaments ou avec des produits à base de plante. Il est important de préciser à votre pharmacien l'ensemble des produits avec ou sans ordonnance que vous prenez ou souhaitez prendre.




Le **brentuximab vedotin** est administré au 1^{er} jour du cycle, de façon concomitante avec d'autres molécules de chimiothérapies. Vous recevrez le traitement pendant 3 jours pour chaque cycle de 21 jours.

Des médicaments contre les réactions à la perfusion et contre les nausées et vomissements peuvent vous être prescrits et administrés avant et après la perfusion des produits de chimiothérapie.



Le temps de perfusion total de la chimiothérapie est d'environ 4h au 1^{er} jour, 2^{ème} jour et 3^{ème} jour de chaque cycle.



Ce protocole est habituellement administré pendant 4 cures de 21 jours.

Suivi au domicile

Si vous le souhaitez, dans les suites de l'initiation du traitement, vous pouvez intégrer un programme de télésurveillance.

L'objectif de ce programme est de repérer précocement les effets indésirables au traitement en cas de survenue afin de mieux les gérer.

Principaux effets indésirables

Effet indésirable	Conduite à tenir
Troubles hématologiques 	Une baisse des globules rouges (risque de fatigue, pâleur, palpitations), des plaquettes (risque de saignement) et des globules blancs (risque d'infection) peut apparaître sous traitement. Surveiller votre température régulièrement. Contacter votre médecin en cas de température supérieure à 38°C ou survenue de frissons.
Troubles digestifs 	La survenue de troubles digestifs (nausées, diarrhées, constipation et vomissements) est fréquente sous traitement. Prendre les médicaments prescrits par votre médecin en cas de survenue de symptômes. Une perte de poids avec diminution de l'appétit est également constatée avec ce traitement. Il est conseillé de manger des petites quantités régulièrement afin de faciliter la prise alimentaire. Prévenir votre médecin dès les premiers signes persistants. Une diététicienne pourra également intervenir au besoin.
Hyperglycémie 	Une hyperglycémie peut être constatée sous traitement. Une analyse sanguine sera faite de façon régulière afin de vérifier le taux de sucre dans le sang.
Troubles cutanés 	Des cas de démangeaisons, éruptions cutanées parfois graves peuvent survenir. Utiliser En cas de survenue de symptômes, contacter votre médecin.
Syndrome de lyse tumorale 	Il est fréquent au début du traitement en raison de la destruction rapide des cellules cancéreuses. Vous pouvez ressentir des nausées, une fièvre, un essoufflement, des douleurs musculaires et articulaires ainsi qu'une fatigue inhabituelle. Une hydratation importante et des médicaments contre le syndrome de lyse peuvent vous être donnés en préventif. Contactez votre médecin en cas d'apparition de ces symptômes.
Troubles respiratoires 	Des symptômes tels qu'un essoufflement, une toux inhabituelle peuvent apparaître. Contacter votre médecin en cas de survenue de ces symptômes.
Neuropathies périphériques 	Des picotements au niveau des maines et des pieds peuvent survenir. Ces troubles sont pour la plupart temporaires et doivent être signalés à votre médecin.
Troubles hépatique 	Des douleurs dans le côté droit du ventre, des nausées, un jaunissement de la peau ou des yeux peuvent survenir, traduisant un trouble hépatique. Prévenir votre médecin dès les premiers signes. Une analyse sanguine pourra alors être mise en place.
Perte des cheveux 	Une perte des cheveux est fréquente sous traitement. Les cheveux repoussent à l'arrêt de la chimiothérapie. Prévenir votre médecin si vous souhaitez la prescription d'une prothèse capillaire.

Ces effets indésirables ne sont pas systématiques. Votre médecin saura les prendre en charge.

En cas de survenue d'effet indésirable non mentionné sur cette fiche, parlez-en à votre médecin ou pharmacien.