

RENSEIGNEMENTS DESTINÉS AUX PATIENT·E·S

LISEZ CE DOCUMENT POUR UNE UTILISATION SÉCURITAIRE ET EFFICACE DE VOTRE MÉDICAMENT

Pr **DARZALEX® SC**

injection de daratumumab

1 800 mg/15 mL (120 mg/mL), solution pour injection sous-cutanée

Lisez ce qui suit attentivement avant d'utiliser **Darzalex SC** et à chaque injection. Ce feuillet est un résumé et il ne contient donc pas tous les renseignements pertinents au sujet de ce produit. Discutez avec votre professionnel de la santé de votre maladie et de votre traitement, et demandez-lui si de nouveaux renseignements sur **Darzalex SC** sont disponibles.

Votre cancer peut être traité par Darzalex en association avec d'autres médicaments. Lisez les feuillets des autres médicaments ainsi que celui-ci. Cela vous aidera à comprendre les informations relatives à ces médicaments.

Pourquoi utilise-t-on Darzalex SC?

Darzalex SC est utilisé chez les adultes, âgés de 18 ans ou plus, pour traiter :

- un type de cancer appelé myélome multiple. Il s'agit d'un cancer des cellules du plasma qui sont présentes dans la moelle osseuse;
- une maladie du sang appelée amylose amyloïde à chaîne légère (AL) nouvellement diagnostiquée. Dans le cas d'une amylose AL, les cellules anormales du sang produisent des quantités excessives d'une protéine anormale qui se dépose dans divers organes, ce qui empêche ces organes de fonctionner correctement.

Comment Darzalex SC agit-il?

Darzalex SC contient une substance active appelée daratumumab. Le daratumumab appartient à un groupe de médicaments appelés anticorps monoclonaux. Le daratumumab se fixe aux cellules du myélome et agit de plusieurs façons pour tuer les cellules cancéreuses. Il est possible que vous receviez Darzalex SC avec d'autres médicaments utilisés pour traiter le myélome multiple ou que vous ayez déjà pris de tels médicaments auparavant. Darzalex SC agit d'une manière différente par rapport à ces autres médicaments. Dans le cas d'une amylose AL, le daratumumab se fixe à des cellules spécifiques anormales du sang afin que le système immunitaire puisse les détruire.

Quels sont les ingrédients de Darzalex SC?

Ingrédient médicamenteux : daratumumab.

Ingrédients non médicamenteux : L-histidine, chlorhydrate de L-histidine monohydraté, L-méthionine, polysorbate 20, hyaluronidase humaine recombinante (rHuPH20), sorbitol, eau pour préparations injectables.

Darzalex SC se présente sous la forme pharmaceutique suivante :

Darzalex SC est offert sous forme de solution administrée par injection sous-cutanée (sous la peau). Il est fourni en fioles de 15 mL. Chaque fiole de solution contient 1 800 mg de daratumumab (concentration de 120 mg/mL).

N'utilisez pas Darzalex SC dans le cas suivant :

- si vous êtes allergique au daratumumab ou à tout autre ingrédient de Darzalex SC.

En cas de doute, parlez à votre médecin ou à un membre du personnel infirmier avant de recevoir Darzalex SC.

Consultez votre professionnel de la santé avant d'utiliser Darzalex SC, afin d'assurer l'utilisation adéquate du médicament et d'aider à éviter les effets secondaires. Informez votre professionnel de la santé de votre état actuel et de vos problèmes de santé, notamment :

- si vous êtes enceinte, pensez être enceinte ou envisagez de le devenir. Si vous devenez enceinte pendant le traitement par Darzalex SC, informez-en votre médecin ou personnel infirmier immédiatement. Vous et votre médecin déciderez si les bénéfices d'un traitement par Darzalex SC sont supérieurs aux risques pour votre bébé. Les femmes traitées par Darzalex SC doivent utiliser une méthode de contraception efficace au cours du traitement et pendant au moins les 3 mois qui suivent le traitement. Darzalex SC peut nuire à l'enfant à naître;
- si vous produisez du lait maternel. Vous et votre médecin déciderez si les bienfaits de l'allaitement sont supérieurs aux risques pour votre bébé. Ce médicament pourrait passer dans le lait maternel et on ne sait pas s'il peut avoir un effet sur le bébé;
- si vous avez des problèmes respiratoires comme de l'asthme ou une maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC). On vous donnera des médicaments à inhaler qui vous aideront si vous avez des problèmes respiratoires après l'injection :
 - médicaments pour aider à maintenir l'ouverture des voies respiratoires dans vos poumons (bronchodilatateurs);
 - médicaments pour réduire l'œdème (gonflement) et l'irritation de vos poumons (corticostéroïdes);
- si vous avez eu le zona;
- si vous avez eu une infection par le virus de l'hépatite B ou pensez en avoir une en ce moment;
- si vous avez des antécédents de problèmes cardiaques. Darzalex SC ne doit pas être utilisé chez les patients atteints d'une amylose AL avec une maladie cardiaque très avancée sauf dans le cadre d'essais cliniques.

Si vous avez besoin d'une transfusion sanguine, vous devrez d'abord faire un examen sanguin pour déterminer votre compatibilité avec le sang du donneur. Darzalex SC peut influencer sur les résultats de cet examen sanguin. Informez la personne qui effectue l'examen que vous êtes traité par Darzalex SC.

Autres mises en garde**Réactions liées à l'administration (réactions systémiques [généralisées] liées à l'administration)**

Avant et après chaque injection de Darzalex SC, on vous administrera des médicaments qui aident à réduire le risque de réactions liées à l'administration. Ces réactions peuvent survenir

lorsque vous recevez le médicament ou dans les 3 jours suivant l'injection. Ces réactions sont plus susceptibles de se produire à la première injection.

Informez votre médecin ou un membre du personnel infirmier immédiatement si vous avez l'un des symptômes d'une réaction liée à l'administration. Ces symptômes comprennent :

- frissons
- mal de gorge/serrement dans la gorge
- fièvre
- toux
- sensation d'être malade
- nez qui pique, qui coule ou qui est bouché
- sensation d'essoufflement ou autres problèmes respiratoires, y compris respiration sifflante
- augmentation de la tension artérielle
- étourdissements ou sensation de tête légère
- maux de tête
- éruption cutanée ou urticaire
- nausées
- vomissements
- démangeaisons

Vous pourriez avoir une réaction allergique grave, même si ces réactions surviennent rarement. Si l'un des symptômes de réaction allergique grave ci-dessous survient, informez immédiatement votre médecin ou un membre du personnel infirmier. Ces symptômes comprennent :

- gonflement du visage, des lèvres, de la bouche, de la langue ou de la gorge
- difficulté à avaler ou à respirer
- éruption cutanée avec démangeaisons (urticaire)
- douleur oculaire (touchant l'œil)
- vision trouble

Votre médecin pourrait décider de ne pas utiliser Darzalex SC si vous avez une réaction sévère liée à l'administration.

Réactions au site d'injection

Les réactions cutanées au site d'injection ou non loin de celui-ci (réactions localisées), y compris les réactions au site d'injection, peuvent survenir avec Darzalex SC. Les symptômes cutanés peuvent comprendre : démangeaisons, gonflement, douleur, bleus, saignement ou rougeur.

Infections

Darzalex SC peut augmenter la survenue des infections. Ces infections pourraient être graves, mettre la vie en danger ou être potentiellement fatales. Si vous venez à présenter de la fièvre, une grande fatigue, une toux ou des symptômes rappelant ceux de la grippe, contactez votre professionnel de la santé.

Virus de l'hépatite B

Informez votre médecin si vous avez déjà eu une infection par le virus de l'hépatite B ou pensez en avoir une en ce moment puisque Darzalex SC peut réactiver le virus de l'hépatite B. Votre médecin surveillera l'apparition de tout signe de cette infection avant, pendant, ainsi que

quelque temps après le traitement par Darzalex SC. Informez votre médecin immédiatement si votre fatigue s'aggrave ou si vous constatez un jaunissement de votre peau ou de la partie blanche de vos yeux.

Problèmes cardiaques chez les patients atteints d'une amylose AL

Des problèmes cardiaques, parfois mortels, sont survenus. Votre professionnel de la santé vous surveillera de près pendant le traitement par Darzalex SC. Appelez immédiatement votre professionnel de la santé si l'un des symptômes suivants survient : douleur à la poitrine, sensation de faiblesse, jambes enflées, essoufflement ou rythme cardiaque anormal.

Changements dans les résultats des examens sanguins

Darzalex SC peut influencer sur les résultats des examens sanguins de compatibilité. Cette interférence peut persister jusqu'à 6 mois après votre dernière dose de Darzalex SC. Votre professionnel de la santé devra effectuer les examens sanguins de compatibilité avant de commencer votre traitement par Darzalex SC. Avant de recevoir des transfusions sanguines, dites à tous vos professionnels de la santé que vous suivez un traitement par Darzalex SC.

Diminution du nombre de cellules sanguines

Darzalex SC peut entraîner une diminution du nombre de globules blancs dans votre sang (cellules qui aident à lutter contre les infections) et du nombre de plaquettes (cellules qui aident le sang à coaguler). Si vous venez à présenter de la fièvre ou avez des signes de bleus ou de saignement, contactez votre professionnel de la santé.

Grossesse

On pense que le lénalidomide et la pomalidomide peuvent avoir un effet nocif sur un bébé à naître. Quand Darzalex SC est administré en association avec l'un ou l'autre de ces médicaments, vous devez aussi lire les renseignements destinés aux patients sur le lénalidomide ou la pomalidomide. Si vous utilisez le lénalidomide ou la pomalidomide, vous devez suivre le programme de prévention de la grossesse conçu pour les personnes traitées par ces médicaments. Le bortézomib et le carfilzomib peuvent avoir un effet nocif sur un bébé à naître. Quand Darzalex SC est administré en association avec le bortézomib ou le carfilzomib, vous devez aussi lire les renseignements destinés aux patients sur ces médicaments. Le cyclophosphamide peut avoir un effet nocif sur un bébé à naître. Quand Darzalex SC est administré en association avec le cyclophosphamide, vous devez aussi lire les renseignements destinés aux patients sur le cyclophosphamide.

Mentionnez à votre professionnel de la santé tous les médicaments et produits de santé que vous utilisez, y compris : médicaments d'ordonnance et en vente libre, vitamines, minéraux, suppléments naturels et produits de médecine douce.

Des interactions avec d'autres médicaments, vitamines, minéraux, suppléments naturels ou médicaments de médecine douce n'ont pas été établies avec Darzalex SC.

Comment utiliser Darzalex SC?

- Darzalex SC vous sera administré par un médecin ou un membre du personnel infirmier.
- Il sera injecté sous la peau (injection sous-cutanée) pendant environ 3 à 5 minutes.
- Il sera administré dans la région de l'estomac (abdomen).

Dose habituelle

La dose habituelle de Darzalex SC est de 1 800 mg de daratumumab (1 800 mg/15 mL). Darzalex SC peut être administré seul ou avec d'autres médicaments qui servent à traiter le myélome multiple (c'est-à-dire le bortézomib, le lénalidomide, la pomalidomide, le carfilzomib, la dexaméthasone, le melphalan ou la prednisone).

Dans le cas d'une amylose AL, Darzalex SC est administré avec le bortézomib, le cyclophosphamide et la dexaméthasone.

Lorsqu'il est administré seul ou avec certains médicaments, Darzalex SC est donné selon le calendrier suivant :

- une fois par semaine pendant les 6, 8 ou 9 premières semaines,
- puis une fois toutes les 2 ou 3 semaines pendant 15, 16 ou jusqu'à 48 semaines,
- puis une fois toutes les 4 semaines, tant que votre état ne s'aggrave pas.

Selon les autres médicaments administrés en même temps que Darzalex SC, votre médecin pourra changer l'intervalle entre les doses, ainsi que le nombre de traitements à recevoir.

Autres médicaments administrés pendant votre traitement par Darzalex SC :

Avant chaque injection de Darzalex SC, on vous administrera d'autres médicaments qui aident à réduire le risque de réactions systémiques (généralisées) liées à l'administration. Ces médicaments peuvent comprendre :

- médicaments pour traiter une réaction allergique (antihistaminiques);
- médicaments pour traiter une inflammation (corticostéroïdes);
- médicaments contre la fièvre (comme l'acétaminophène).

Après chaque injection de Darzalex SC, on vous administrera d'autres médicaments (comme des corticostéroïdes) pour réduire le risque de réactions après votre injection.

Personnes présentant des problèmes respiratoires

Si vous avez des problèmes respiratoires, comme de l'asthme ou une maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC), on vous administrera des médicaments à inhaler pour atténuer vos problèmes respiratoires :

- médicaments pour aider à maintenir l'ouverture des voies respiratoires dans vos poumons (bronchodilatateurs);
- médicaments pour réduire l'œdème (gonflement) et l'irritation de vos poumons (corticostéroïdes).

On pourrait vous donner des médicaments pour réduire le risque d'avoir un zona.

Surdose

Ce médicament vous sera administré par votre médecin ou un membre du personnel infirmier. Dans le cas peu probable où l'on vous administrerait trop de médicament (surdose), votre médecin vous surveillera pour déceler tout effet secondaire.

Si vous pensez qu'une personne dont vous vous occupez ou que vous-même avez reçu une trop grande quantité de Darzalex SC, contactez immédiatement un professionnel de la santé, le service des urgences d'un hôpital ou le centre antipoison de votre région, même en l'absence de symptômes.

Dose oubliée

Il est très important de vous présenter à tous vos rendez-vous. Si vous manquez un rendez-vous, informez votre médecin et fixez un autre rendez-vous dès que possible.

Quels sont les effets secondaires qui pourraient être associés à Darzalex SC?

Darzalex SC est généralement bien toléré. Toutefois, comme tous les médicaments, il peut causer des effets secondaires.

Lorsque vous recevez Darzalex SC, vous pourriez présenter des effets secondaires qui ne sont pas mentionnés ci-dessous. Si c'est le cas, parlez à votre professionnel de la santé.

Les effets secondaires de Darzalex SC (utilisé seul ou associé à d'autres médicaments) qui peuvent toucher plus de 1 personne sur 5 ($\geq 20\%$) comprennent :

- sensation de fatigue
- nausées
- diarrhée
- constipation
- douleur abdominale
- douleur au dos
- toux
- faible nombre de globules blancs (neutropénie)
- faible nombre d'un type de cellules sanguines appelées « plaquettes » (thrombopénie)
- fièvre
- gonflement
- infections des voies respiratoires (comme le nez, les sinus ou la gorge)
- neuropathie périphérique sensitive (engourdissement ou picotement dans les pieds ou les mains)
- faible taux de potassium dans le sang (hypokaliémie)
- COVID-19

Les autres effets secondaires touchant plus de 1 personne sur 20 ($\geq 5\%$) comprennent :

- frissons
- spasmes musculaires
- maux de tête
- étourdissements
- évanouissement
- perte d'appétit
- sensation de grande faiblesse
- difficulté à s'endormir
- vomissements
- maux d'estomac

- douleur dans la poitrine, les bras, les jambes, les muscles, les articulations ou les os
- douleur dans la bouche ou dans la gorge
- éruption ou démangeaison cutanée
- infection pulmonaire (comme une pneumonie)
- grippe ou symptômes rappelant ceux de la grippe, congestion nasale
- sensation de picotement ou de brûlure de la peau (paresthésie)
- tremblement des mains
- altération du goût
- infection urinaire
- faible nombre de globules blancs (lymphopénie, leucopénie)
- diminution du taux de calcium dans le sang
- diminution du taux de potassium dans le sang
- augmentation du sucre dans le sang
- augmentation (hypertension) ou diminution (hypotension) de la tension artérielle
- anxiété ou dépression
- atteinte rénale
- essoufflement (y compris en raison de l'accumulation de liquide dans les poumons)
- perte de poids
- vision brouillée

Effets secondaires graves et mesures à prendre			
Symptôme ou effet	Consultez un professionnel de la santé.		Cessez d'utiliser le médicament et obtenez immédiatement des soins médicaux.
	Dans les cas sévères seulement	Dans tous les cas	
TRÈS FRÉQUENT (plus de 1 personne sur 10)			
Faible nombre de cellules sanguines, comme : - les plaquettes (thrombopénie) - les globules blancs (neutropénie) - les globules rouges (anémie) (symptômes tels que fatigue, perte d'énergie, faiblesse, essoufflement)		✓	
Infections des voies respiratoires supérieures (nez, sinus ou gorge infecté; rhume)		✓	
FRÉQUENT (moins de 1 personne sur 10, mais plus de 1 personne sur 100)			

Réactions liées à l'administration. Les symptômes peuvent comprendre : • frissons • mal de gorge, toux • sensation d'être malade • nez qui pique, qui coule ou qui est bouché • sensation d'essoufflement ou autres problèmes respiratoires • augmentation de la tension artérielle			✓
Infections pulmonaires comme : • pneumonie • grippe • bronchite • infections des voies respiratoires inférieures (Les symptômes d'une infection pulmonaire peuvent comprendre congestion, toux, mal de gorge, courbatures, fatigue et fièvre.)		✓	
Infections comme : • sepsis ou choc septique (symptômes tels qu'une fièvre élevée, une accélération du rythme cardiaque ou de la respiration et une confusion) • infection urinaire (symptômes tels qu'une douleur ou brûlure en urinant, une urine sanguinolente, trouble ou malodorante)		✓	
Fièvre élevée		✓	
Rythme cardiaque irrégulier ou rapide (fibrillation auriculaire)		✓	
Problèmes de saignement (symptômes tels que sang dans les selles, crachats de sang)		✓	
Diarrhée sévère (symptômes tels qu'augmentation du nombre de selles, selles liquides ou sanguinolentes, douleur et/ou crampes à l'estomac)		✓	
Pancréatite (inflammation du pancréas dont les symptômes peuvent comprendre : douleur abdominale, fièvre, nausée, vomissements)		✓	
PEU FRÉQUENT (moins de 1 personne sur 100, mais plus de 1 personne sur 1 000)			
Un type d'infection par le virus de l'herpès appelé infection à cytomégalovirus qui peut causer les		✓	

symptômes suivants : fièvre, mal de gorge, fatigue ou gonflement des ganglions. Ce virus peut infecter d'autres parties du corps, comme les poumons (toux ou troubles respiratoires), les yeux (modification de la vision ou douleur oculaire) et les intestins (diarrhée ou douleur à l'estomac).			
RARE (moins de 1 personne sur 1 000, mais plus de 1 personne sur 10 000)			
Réaction allergique grave (symptômes tels que visage, lèvres, bouche, langue ou gorge enflés, difficulté à avaler ou à respirer, éruption cutanée avec démangeaisons (urticaire), douleur oculaire, vision trouble)			✓

Si vous présentez un symptôme ou un effet secondaire incommodant qui n'est pas mentionné ici ou qui s'aggrave au point de perturber vos activités quotidiennes, parlez-en à votre professionnel de la santé.

Déclaration des effets secondaires

Vous pouvez déclarer des effets secondaires soupçonnés d'être associés à l'utilisation d'un produit de santé à Santé Canada

- en visitant le site Web de déclaration des effets indésirables (<https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/medeffet-canada/declaration-effets-indesirables.html>) pour vous informer sur comment faire une déclaration en ligne, par courrier, ou par télécopieur;
- ou
- en téléphonant sans frais au 1-866-234-2345.

REMARQUE : Consultez votre professionnel de la santé si vous avez besoin de renseignements sur le traitement des effets secondaires. Le Programme Canada Vigilance ne donne pas de conseils médicaux.

Conservation

Darzalex SC sera conservé au réfrigérateur à une température entre 2 et 8 °C.

Pour en savoir plus sur Darzalex SC :

- Parlez-en à votre professionnel de la santé.
- Pour toute question ou préoccupation, veuillez contacter le fabricant, Janssen Inc., à l'adresse www.janssen.com/canada.
- Consultez la monographie intégrale rédigée à l'intention des professionnels de la santé, qui renferme également les Renseignements destinés aux patient·e·s. Ce document est disponible sur le site Web de Santé Canada (<https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/medicaments/base-donnees-produits->

[pharmaceutiques.html](#)), le site Web du fabricant (www.janssen.com/canada), ou peut être obtenu en composant le 1-800-567-3331 ou le 1-800-387-8781.

Le présent feuillet a été rédigé par :
Janssen Inc., une compagnie Johnson & Johnson
Toronto (Ontario) M3C 1L9

Dernière révision : novembre 2025
© Johnson & Johnson et ses filiales
Marques de commerce utilisées sous licence.