

## Isatuximab/ Pomalidomide/Déxaméthasone Protocole IPD

### Présentation du traitement

Votre traitement comprend deux molécules prises par voie orale, la **déxaméthasone** et le **pomalidomide**. Un produit sera administrée en hôpital de jour par voie intraveineuse, l'**isatuximab**. Ce traitement est prescrit et renouvelé par votre médecin hématologue.



La **déxaméthasone** et le **pomalidomide** sont disponibles uniquement dans votre **pharmacie hospitalière**.

### Modalités d'administration

Un bilan sanguin vous sera demandé dans les jours précédents l'initiation du traitement puis à intervalle régulier pour s'assurer de la possibilité de réaliser le traitement.



La **déxaméthasone** est à prendre le **matin pendant le petit déjeuner**.

La **gélule de pomalidomide** est à avaler avec un grand verre d'eau **une seule fois par jour, à heure régulière**.

En cas **d'oubli de prise** du **pomalidomide** de moins de 12h, vous pouvez prendre la dose manquante. En cas de vomissement de la gélule, ne reprenez pas la dose. Prenez la dose suivante à l'heure habituelle.



Il vous sera demandé de **signer un accord de soin** avant toute initiation de traitement par **pomalidomide** après information par votre médecin hématologue du **risque de malformations fœtales** en cas de grossesse et **des précautions requises**. L'**allaitement** doit être **interrompu** durant le traitement. Le **pomalidomide** est **contre-indiqué pendant la grossesse** et chez les femmes en âge de procréer n'utilisant pas de méthode de **contraception efficace**. Un carnet de suivi vous sera donné et un test de grossesse à chaque dispensation vous seront demandés.

**Pendant toute la durée du protocole, vous recevrez des traitements au domicile pour la prévention contre les infections**



Les médicaments administrés dans le cadre de votre protocole peuvent interagir avec vos autres médicaments ou avec des produits à base de plante. Il est important de préciser à votre pharmacien l'ensemble des produits avec ou sans ordonnance que vous prenez ou souhaitez prendre.



Votre protocole se compose de **cycles de 28 jours**. Lors du **1<sup>er</sup> cycle**, vous recevrez l'**isatuximab** et la **déxaméthasone** un jour par semaine. Le **pomalidomide** sera à prendre entre le 1<sup>er</sup> jour et le 21<sup>ème</sup> jour du cycle.

A partir du 2<sup>ème</sup> cycle, l'**isatuximab** sera administré uniquement le **1<sup>er</sup> jour et le 15<sup>ème</sup> jour de chaque cycle**.

**Cycles de 28 jours**  
**J1=J29**



### Suivi

Si vous le souhaitez, dans les suites de l'initiation du traitement, vous pouvez intégrer un programme de télésurveillance.

L'objectif de ce programme est de repérer précocement les effets indésirables au traitement en cas de survenue afin de mieux les gérer.

## Principaux effets indésirables

| Effet indésirable                                                                                                   | Conduite à tenir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Troubles hématologiques</b><br> | Une baisse des globules rouges ( <b>risque de fatigue, pâleur, palpitations</b> ), des plaquettes ( <b>risque de saignement</b> ) et des globules blancs ( <b>risque d'infection</b> ) peut apparaître sous traitement.<br><b>Surveillez votre température régulièrement. Contactez votre médecin en cas de température supérieure à 38°C ou survenue de frissons.</b>                      |
| <b>Troubles pulmonaires</b><br>    | Des <b>difficultés</b> à respirer, un <b>essoufflement</b> inhabituel et une <b>toux</b> peuvent apparaître.<br>Dans ce cas, <b>prévenez votre médecin</b> dès l'apparition des premiers signes pour la réalisation d'examens complémentaires                                                                                                                                               |
| <b>Troubles cutanés</b><br>        | <b>Evitez</b> de vous exposer au soleil. Il est possible que vous présentiez des <b>démangeaisons</b> , une <b>éruption cutanée</b> ou une <b>sécheresse</b> au niveau de la peau.<br>Utilisez une <b>crème solaire</b> indice 50 en cas d'exposition au soleil. Appliquez une <b>crème hydratante</b> sur toutes les zones de la peau sèche. Utilisez un <b>savon doux</b> pour la douche. |
| <b>Troubles digestifs</b><br>     | <b>Des troubles digestifs</b> non spécifiques peuvent apparaître sous traitement. <b>Diarrhées</b> ou <b>constipation</b> , <b>nausées</b> et <b>vomissements</b> .<br><b>Adaptez votre alimentation</b> en fonction de vos symptômes. <b>Prévenez votre médecin</b> en cas de <b>persistance des symptômes</b> .                                                                           |
| <b>Thrombose</b><br>             | Il est possible d'observer une <b>rougeur</b> , <b>douleur</b> et/ou <b>gonflement</b> au niveau des <b>jambes</b> et des <b>bras</b> , <b>qui peuvent être des signes de thrombose</b> .<br><b>Prévenez votre médecin</b> si vous observez ces symptômes                                                                                                                                   |

**Ces effets indésirables ne sont pas systématiques. Votre médecin saura les prendre en charge.**

En cas de survenue d'effet indésirable non mentionné sur cette fiche, parlez-en à votre médecin ou pharmacien.