

Téclistamab TECVAYLI®

Présentation du traitement

Le **téclistamab** est un médicament de thérapie ciblée administré par voie sous cutanée à l'hôpital.
Ce médicament est prescrit par votre médecin hématologue.



Modalités d'administration

Un bilan sanguin vous sera demandé dans les jours précédents l'initiation du traitement puis à intervalle régulier afin de s'assurer de la possibilité de réaliser le traitement.



Un patch anesthésiant pourra être posé 30 à 60 minutes avant d'administrer le produit de thérapie ciblée par voie sous-cutanée.

Le traitement peut interagir avec vos autres médicaments ou avec des produits à base de plante. Il est important de préciser à votre pharmacien l'ensemble des produits avec ou sans ordonnance que vous prenez ou souhaitez prendre.




Le **téclistamab** est administré le 1^{er} jour, le 8^{ème} jour et le 15^{ème} jour du premier cycle. Les administrations se poursuivront à partir du 21^{ème} jour, une fois par semaine..

Des médicaments contre les réactions à la perfusion et contre les nausées et vomissements peuvent vous être prescrits et administrés avant et après l'administration du produit.



Le **téclistamab** sera administré par voie sous-cutanée sur une courte durée : de **3 à 5 minutes**.

Administration
hebdomadaire



Le **téclistamab** sera administré une fois par semaine pendant au moins 6 mois avant d'envisager un espacement de l'intervalle d'administration.

Suivi au domicile

Si vous le souhaitez, dans les suites de l'initiation du traitement, vous pouvez intégrer un programme de télésurveillance.

L'objectif de ce programme est de repérer précocement les effets indésirables au traitement en cas de survenue afin de mieux les gérer.

Principaux effets indésirables

Effet indésirable	Conduite à tenir
Syndrome de neurotoxicité 	Des troubles neurologiques peuvent survenir dans les suites de l'injection et jusqu'à plusieurs jours ou semaines après l'injection. Les symptômes peuvent inclure des difficulté à parler ou à écrire, une somnolence, une confusion mentale/désorientation, une faiblesse musculaire, des convulsions et une perte de mémoire. Ces symptômes sont principalement temporaires et nécessitent l'administration de traitements spécifiques. Contacter votre médecin en cas de survenue.
Troubles hématologiques 	Une baisse des globules rouges (risque de fatigue, pâleur, palpitations), des plaquettes (risque de saignement) et des globules blancs (risque d'infection) peut apparaître sous traitement. Surveiller votre température régulièrement. Contacter votre médecin en cas de température supérieure à 38°C ou survenue de frissons.
Syndrome de relargage cytokinique 	Les symptômes peuvent inclure fièvre, vomissements, vertiges ou étourdissements, frissons, rythme cardiaque rapide, difficultés à respirer/essoufflement et maux de tête. Ces symptômes surviennent principalement pendant la phase de l'escalade de dose. Contacter votre médecin si vous ressentez ces symptômes.
Troubles digestifs 	La survenue de troubles digestifs est fréquente sous traitement. Diarrhées, nausées et vomissements. Prendre les médicaments prescrits par votre médecin en cas de survenue de symptômes. Boire si possible 2 litres par jour (eau, thé ou tisanes autorisés, bouillons, boissons gazeuses) et privilégier les féculents (riz, pâtes...). Prévenir votre médecin dès les premiers signes persistants (dès 3 diarrhées par jour).
Réaction au site d'injection 	Le téclistamab étant administré par voie sous-cutanée, une réaction au site d'injection de type érythème ou nodule accompagné de douleurs peut apparaître. Cet effet indésirable s'estompe rapidement dans le temps. En cas de persistance, contacter votre médecin.
Douleurs musculaires 	Les douleurs musculaires sont assez rares mais peuvent nécessiter une prise en charge spécifique. Contacter votre médecin si les symptômes persistent.

Ces effets indésirables ne sont pas systématiques. Votre médecin saura les prendre en charge.

En cas de survenue d'effet indésirable non mentionné sur cette fiche, parlez-en à votre médecin ou pharmacien.